

Opciones de aborto con medicamentos

	Mifepristona + Misoprostol	Solo Misoprostol
¿Cómo funciona?	Se usan dos medicamentos: <ul style="list-style-type: none"> • La mifepristona hace que el embarazo se desprenda. • El misoprostol hace que el útero se contraiga y empuje el embarazo fuera del cuerpo. 	Se usa un medicamento: <ul style="list-style-type: none"> • El misoprostol hace que el útero se contraiga y empuje el embarazo fuera del cuerpo.
¿Qué tan eficaz es?	Aproximadamente 95% de las veces, el embarazo termina sin necesidad de tratamiento adicional (medicamentos o un procedimiento)	Aproximadamente 85-90% de las veces, el embarazo termina sin necesidad de tratamiento adicional (medicamentos o un procedimiento)
¿Cuánto tiempo toma?	Generalmente, el sangrado y los cólicos comienzan entre 1 y 4 horas después de tomar misoprostol, pero pueden tardar hasta 24 horas	Generalmente, el sangrado y los cólicos comienzan dentro de las 24 horas después de tomar misoprostol, pero pueden tardar más
¿Cómo me sentiré?	Tendrás cólicos fuertes y sangrado abundante dentro de unas horas después de tomar el misoprostol. Es posible que tenga sangrado y cólicos intermitentes por unos días. También puedes tener náuseas, vómitos, diarrea, escalofríos, fiebre leve (99–100°F), o fatiga. Estos son efectos secundarios comunes del misoprostol y no deberían durar más de 24 horas.	
¿Cuánto sangraré?	Es común tener sangrado abundante y expulsar coágulos después de tomar misoprostol. Algunas personas pueden tener sangrado más ligero en embarazos de menos de 6 semanas. El sangrado puede continuar de forma intermitente por 4 a 6 semanas.	
¿Cuáles son otras diferencias importantes?	Mifepristona y misoprostol es el régimen de aborto con medicamentos más utilizado en los Estados Unidos.	El aborto solo con misoprostol también es seguro y efectivo. Puede utilizarse cuando la mifepristona no está disponible.
	Generalmente requiere 1 a 2 dosis de misoprostol	Generalmente requiere 3 a 5 dosis de misoprostol
	Puede causar menos efectos secundarios (náuseas, diarrea, fiebre y escalofríos)	Puede causar más efectos secundarios (náuseas, diarrea, fiebre y escalofríos)
	Es más probable que termine completamente el embarazo sin necesitar tratamiento adicional	Hay una probabilidad ligeramente mayor de necesitar medicamentos adicionales o un procedimiento de aborto